

# メロン栽培技術情報 No.4

平成30年6月7日  
JA大潟村営農支援課  
大潟村メロン生産班

## ハダニの防除について

今後気温が上昇してくると、昨年同様にハダニによる被害が予想されます。ハダニに関しては定期的な防除が被害を防ぐこととなりますので、下記の薬剤等を参考にしながら、防除にあってください。

(散布に関する注意事項)

- ★ 葉の裏までまんべんなく散布する。
- ★ 一部で見られれば、すでにハウス全体に広がっていると考えられるので、部分的な防除ではなく、ハウス全体を防除する。

～開花前～

ハダニの発生は比較的少ない時期なので、他の病害虫にも効果のある予防的な薬剤で防除をする。特にミツバチを導入する前なので、ミツバチに影響が大きい薬剤(メロン栽培技術情報NO, 2参考)は使用しないでください。

適用病害名	薬剤名	希釈倍率	収穫前日数	使用回数
アブラムシ・ダニ予防・発生	アーデント水和剤	1,000倍	前日まで	5回

～交配後～

着果確認後、再度防除する。以後10日程度の間隔で、防除を行う。

適用病害名	薬剤名	希釈倍率	収穫前日数	使用回数
ハダニ類発生時	スターマイトフロアブル	2,000倍	前日まで	1回
ハダニ類発生時	コロマイト乳剤	1,000倍	前日まで	2回
ハダニ類発生時	ダニトロンフロアブル	1,000倍	前日まで	1回
ハダニ類発生時	ダニサラバフロアブル	1,000倍	前日まで	2回
ハダニ類発生時	サンマイトフロアブル	1,000倍	3日前まで	2回