水稲技術情報　ＮＯ－１５

令和８年８月１９日
ＪＡ営農支援課

刈取予想：『あきたこまちRは９月１３日頃の見通し』

１.水稲の生育状況

村内「あきたこまちR」の平均出穂期は平年より４日早い７月３０日でした。また、今後の東北日本海側は平年より高い気温が続くと予想されています。積算気温から推測した「あきたこまちR」の刈取予想日は、現在のところ９月１３日頃と平年より早い見通しとなっております。刈取予想日は、出穂日以降の積算気温から到達日を予測したものであり、刈取判断については各自の圃場を確認のうえ、**籾の黄化率９０%程度を刈取りの目安**としてください。また、他品種についても積算平均気温から見た現在の予想はつぎの通りとなっております。

２.水稲の刈取予想日（砂地圃場は３日程度早め）

出穂期以降の積算平均気温での刈取予想日（８月１７日以降は平年値で計算）

※あきたこまちRの平均田植日　５月２１日

品種名	出穂期	積算気温到達日	刈取予想日
たつこもち	７月２５日	９月４日 ～ ９月１０日	９月７日
ちほみのり	７月２５日	９月４日 ～ ９月１０日	９月７日
あきたこまちR	７月３０日	９月１０日 ～ ９月１６日	９月１３日
サキホコレ	８月４日	９月１８日 ～ ９月２４日	９月２１日
ゆめおばこ	８月４日	９月２０日 ～ ９月２６日	９月２３日
きぬのはだ	８月４日	９月２０日 ～ ９月２６日	９月２３日
ときめきもち	８月４日	９月２０日 ～ ９月２６日	９月２３日
萌えみのり	８月４日	９月２０日 ～ ９月２６日	９月２３日

※「ゆめおばこ」「萌えみのり」は他品種の予想から推定

３.病害虫防除

● **斑点米カメムシ類、セジロウンカ**

８月１７日に調査をした結果、８月に入ってから好天が続いたこともあり**「例年より多い」**カメムシの発生を確認しております。未防除のほ場や水田内及び隣接地に出穂したノビエやカヤツリグサ科雑草が多いほ場では発生が目立っております。この後、好天日が続く場合は警戒が必要ですので、技術情報Ｎｏ－１４を参考に防除に努めてください。

※ 農薬の使用に当たっては使用法を確認し、環境に配慮した施用量等を心がけてください。

「水稲技術情報」https://www.ja-ogata.or.jp/farming2/をホームページで閲覧の際は、これまで必要だったパスワード入力なしで閲覧可能になりました。

※水稲以外の技術情報は、これまで通りパスワードの入力が必要です。