水稲技術情報　ＮＯ－１６

令和８年９月２日
ＪＡ営農支援課

水稲の刈取予想日
【あきたこまちR：９月１３日頃】

あきたこまちRの出穂期は平年に比べ４日程度早まりました。出穂期以降も高温、多照で経過したことから、刈り取り適期は平年より早まる見込みです。

現在のところ出穂後の積算気温から見た刈取開始は、**あきたこまちRで９月１３日頃**と予想され、他品種についてもつぎの通りとなっておりますが、刈取予想日は、出穂日以降の積算気温から到達日を予測したものであり、刈取判断については各自の圃場を確認のうえ、**籾の黄化率９０%程度を刈取りの目安**としてください。また、本年は積算気温が平年を上回っているため、刈遅れによる「胴割粒」の発生にも注意してください。

１．水稲の刈取予想日（砂地圃場は３日程度早め）

積算平均気温での刈取予想日（８／２８以降は平年値で計算）　※あきたこまちRの平均田植日　５月２１日

品種名	出穂期	積算気温到達日	刈取予想日
たつこもち	７月２５日	９月４日 ～ ９月１０日	９月７日
ちほみのり	７月２５日	９月４日 ～ ９月１０日	９月７日
あきたこまちR	**７月３０日**	**９月１０日 ～ ９月１６日**	**９月１３日**
サキホコレ	８月４日	９月１８日 ～ ９月２４日	９月２１日
ゆめおばこ	８月４日	９月２０日 ～ ９月２６日	９月２３日
きぬのはだ	８月４日	９月２０日 ～ ９月２６日	９月２３日
ときめきもち	８月４日	９月２０日 ～ ９月２６日	９月２３日
萌えみのり	８月４日	９月２０日 ～ ９月２６日	９月２３日

※「ゆめおばこ」「萌えみのり」は他品種の予想から推定

【刈り取り判断の目安】
①出穂後日数
　早生早(たつこもち)：出穂後 45 日頃
　早生晩(あきたこまち R)：出穂後 45～50 日頃
　中生晩(きぬのはだ)：出穂後 50～55 日頃
②出穂後の積算気温
　早 生 種：950～1,050℃
　中晩生種：1,050～1,150℃
③枝梗の黄化程度
　「主軸の上から５番目の枝梗まで黄化した頃」
④最終的には籾の黄化程度 90%（黄白＋黄色）で決定する。



図　籾の熟色、枝梗の黄化程度による刈取り適期の判断（模式図）

収穫期が近づいていることから、薬剤散布に際しては収穫前の使用日数等をご確認ください。

「水稲技術情報」https://www.ja-ogata.or.jp/farming2/をホームページで閲覧の際は、これまで必要だったパスワード入力なしで閲覧可能です。※水稲以外の技術情報は、これまで通りパスワードの入力が必要です。