

刈取予想：『あきたこまちは9月24日頃の見通し』

1. 水稻の生育状況

村内「あきたこまち」の平均出穂期は平年より2日遅れの8月6日でした。出穂前は高温日が続いたものの、出穂以降の気温は概ね平年並みで推移しており、積算気温から推測される刈取予想は、現在のところ9月24日頃となる見通しです。

また、晩生品種については出穂～穂揃いまでに日数を要したことから、収穫予想が難しくなっておりますが、積算平均気温から見た現在の予想はつぎの通りとなっております。

2. 水稻の刈取予想日 (砂地圃場は3日程度早め)

出穂期以降の積算平均気温での刈取予想日(8/21以降は平年値で計算)

品種名	出穂期	積算気温到達日	刈取予想日
たつこもち	8月 2日	9月14日～20日	9月16日
あきたこまち	8月 6日	9月22日～28日	9月24日
ゆめおぼこ	8月12日	10月 9日～15日	10月11日
ときめきもち	8月14日	10月10日～16日	10月13日
きぬのはだ	8月14日	10月10日～16日	10月13日
萌えみのり	8月14日	10月10日～16日	10月13日

※「ゆめおぼこ」「萌えみのり」は他品種の予想から推定

3. 病虫害防除

● 斑点米カメムシ類[発生量：平年並み～やや多い]

J Aが8月18日に村内8地点ですくい取り調査を実施したところ、多発傾向にあった今日1日の調査に比べ減少しておりますが、平年並み～やや多い発生が確認されました。防除をされていない方は、早急に薬剤を散布して防除に努めてください。また、すでに防除をされている方でも、週間天気予報等で今後も気温が高い傾向にあることから警戒が必要であります。1回目の散布から2週間後に2回目の追加防除を実施し万全を期してください。

※あきたこまちは散布時期目安：<2回目>1回目散布から2週間後(8月30日頃)

薬剤等：技術情報NO-14を参照してください

● **いもち病**：穂首及び枝更などの穂いもちが一部で見られております。発生が確認された圃場については技術情報NO-13を参照して防除に努めてください。

※粉剤(混合剤) ◎散布量 3kg/10a

薬剤名	成分数	病虫害名
ブラシントレバリダ粉剤DL	4	いもち・紋枯・カメムシ・ウンカイナゴ