

テクリードC フロアブルの使用に関する注意点

【種子消毒】(水温が上がる4月上旬より開始)

- ①水温が8°C以下と低い場合は、休眠性が逆に深まる場合があるとともに、発芽の不揃いを助長する恐れがあるため水温の確保には十分注意する。
- ②同一の容器（オケ等）に異なる品種を入れて消毒しない。
- ③種子重量の1.5倍～2倍の薬液量、水温10°C～15°C、濃度200倍、24時間で実施する。

1 : 1.5 ~ 2 1.5 ~ 2

※ 使用量例 種子 100kg:水 150ℓ～200ℓ 薬剤 750ml～1ℓ

- ④消毒～催芽中は容器にフタをする。
- ⑤この剤には銅が含まれているため、金属部分の腐食が懸念されることから消毒時にハトムネ催芽機は使用しない。

[水温が低い場合]

ハトムネ催芽機等で水温20°C～25°C程度の“ぬるま湯”を作る。“ぬるま湯”を種子消毒する容器に移し替え、「テクリードC フロアブル」を200倍で希釈する。その後、容器にフタをして24時間浸漬する。

【浸種】

- ①同一の容器（オケ等）に異なる品種を入れ浸種しない。
- ②浸種の糲と水量との容量比は1:2程度とする。例：種子100kg:水200ℓ
- ③浸種時は消毒時と同様に“ぬるま湯”から開始する。気温の低い日が続く場合は、水交換の際に“ぬるま湯”を足すなど、水温を確保するのが望ましい。
- ④水の交換回数は控えめにする。目安は10日間で2回程度、1回目の交換までの日数を長めにする。

(交換のローテーション例・浸種10日間の場合)



【催芽】

- ①異なる品種を同時に催芽しない。
- ②品種毎に催芽機内を（水洗い）洗浄する。

※ 催芽中に泡が発生する場合もあるが、発芽や生育への影響は無い。