

### 田植時の除草体系

播種時期に寒暖差があったものの育苗期間に晴れ間が多かったことで、苗の生育は3日～4日程度早まり、田植え作業も始まってきました。


本年は代かき前に圃場の乾燥が進んだことで、地温が高くなり雑草の発生が早まることが懸念されますので、早期の除草剤散布を心がけ雑草対策をしてください。

#### 【田植時の除草体系】

##### 1) 【ホタルイ】の除草剤体系



##### 2) 【オモダカ】の除草剤体系




##### 3) 【コナギ】の除草剤体系



##### 4) 【クログワイ】の除草剤体系



##### 5) 【マツバイ】の除草剤体系



※表層剥離等で除草剤の拡散抑制による効果低下が懸念される場合



区分	薬剤名	成分名及び含有量 (%)			成分数
初期剤	メテオフロアブル	ペントキサゾン 5.0			1
	サインヨシフロアブル	ペントキサゾン 8.6			
	ユニハーブフロアブル	プレチラクロール 5.0	ベンゾフェナップ 20.0		2
	クリアホープフロアブル	ペントキサゾン 4.0	ACN 18.0		
	テマカットフロアブル	ペントキサゾン 7.2	ダイムロン 28.0		
	ショキニーフロアブル	ペントキサゾン 4.0	プロモブチド 18.0		
初・中期一発剤	カウンスルコンプリートフロアブル	トリアファモン 0.97	テフリルトリオン 5.8		2
	バッチリフロアブル	ピラクロニル 3.7	イマススルフロン 1.7	プロモブチド 16.3	3
	イネキングフロアブル	ピラクロニル 3.6	ピラゾレート 20.0	ベンゾビシクロン 4.0	
	イッポンフロアブル	ベンスルフロンメチル 1.4	ピラクロニル 4.0	プロモブチド 18.0	
	銀河フロアブル	メタススルフロン 2.0	ピラクロニル 4.0	ダイムロン 20.0	
	アッパレZフロアブル	プロピリスルフロン 1.7	ピラクロニル 3.7	プロモブチド 16.8	
	カチボシフロアブル	ベンスルフロンメチル 1.4	テフリルトリオン 4.0	イプフェンカルハゾン 4.0	
	コメット顆粒	メタススルフロン 7.5	テフリルトリオン 25.0	ピラクロニル 25.0	
	ベンケイ豆つぶ	プロピリスルフロン 2.0	フェキサスルホン 8.0	ベンゾビシクロン 12.0	
中期剤	アトトリ 1 キロ粒剤	ピリミスルファン 0.75			
	ワイドショット 1 キロ粒剤	ペノキススラム 0.5	テフリルトリオン 3.0		2
	レプラス 1 キロ粒剤	メタソスルフロン 1.2	ジメタメリン 1.0	テフリルトリオン 3.0 ダイムロン 10.0	4

※ 育苗中にばか苗の発生が見られた場合は、圃場に持ち込まないようハウス内で抜取りをお願いします。

※ ハウス周辺等に除草剤を散布する際は、近隣ハウスへの飛散に十分注意してください。