水稲技術情報　ＮＯ－１７

令和２年９月３日
ＪＡ営農支援課

水稲の刈取予想日

【あきたこまち：９月１７日頃】

あきたこまちの出穂期は平年に比べ２日早く（８月２日）なり、登熟期間前半の気温は平年並み～やや高めで経過しておりましたが、８月下旬から急激に上昇し、９月の長期予報も前半は高めの予想となっております。

現在のところ出穂後の積算気温から見た刈取開始は、**あきたこまちで９月１７日頃**と予想され、他品種についてもつぎの通りとなっておりますが、刈取予想日は、出穂日以降の積算気温から到達日を予測したものであり、刈取判断については各自の圃場を確認のうえ、**籾の黄化程度９０％以上を刈取りの目安**としてください。

積算平均気温での刈取予想日（9/2以降は平年値で計算）

品種名	出穂期	積算気温到達日	刈取予想日
たつこもち	７月２８日	９月７日 ～ ９月１３日	９月１０日
ちほみのり	７月２９日	９月７日 ～ ９月１３日	９月１０日
あきたこまち	８月　２日	９月１４日 ～ ９月２０日	９月１７日
ゆめおばこ	８月　５日	９月２０日 ～ ９月２６日	９月２２日
ときめきもち	８月　７日	９月２６日 ～ １０月２日	９月２８日
きぬのはだ	８月　７日	９月２６日 ～ １０月２日	９月２８日
萌えみのり	８月　６日	９月２６日 ～ １０月２日	９月２８日

【刈り取り判断の目安】

①出穂後日数
　早生早(たつこもち)：出穂後 45 日頃
　早生晩(あきたこまち)：出穂後 45～50 日頃
　中生晩(ゆめおばこ)：出穂後 50 日頃
　中生晩(きぬのはだ)：出穂後 50～55 日頃

②出穂後の積算気温
　早 生 種：950～1050℃
　中晩生種：1,050～1,150℃

③枝梗の黄化程度
　「主軸の上から５番目の枝梗まで黄化した頃」

④最終的には籾の黄化程度 90%（黄白＋黄色）で決定する。



図　籾の熟色、枝梗の黄化程度による刈取り適期の判断（模式図）

収穫期が近づいていることから、薬剤散布に際しては収穫前の使用日数等をご確認ください。

技術情報は、ホームページ「営農情報」https://www.ja-ogata.or.jp/farming/にも掲載しております。
（組合員専用ページです。ID とパスワードを入力してください。）

ID：jaogt（半角小文字）　パスワード：eino3033（半角英数文字）