# 水稲技術情報　ＮＯ－７

令和４年６月２日
ＪＡ営農支援課

## 雑草・病害虫防除は早めに

田植え時からの高温で苗の活着は順調でありますが、表層剥離や強風による代枯れ等で苦慮されていることと存じます。早期に田植えが終了した圃場では、雑草の発生も見られておりますので、早めの除草剤散布を心がけてください。また、代枯れ症状が見られた圃場については、除草剤の影響を受けにくくなる新葉の出葉が確認されるのを待って散布してください。

また、初中期一発剤の使用後に雑草の残った場合は、以下の薬剤で対応してください。

### １．中・後期除草剤の雑草防除

| 薬剤名 | | 成分数 | 使用時期 | ﾉﾋﾞｴ葉令 | 適用雑草 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヒエ剤 | ｸﾘﾝﾁｬｰ1ｷﾛ粒剤 | 1 | 田植後７日～収穫30日前 | 4.0葉 | ノビエ |
| | **トドメMF1ｷﾛ粒剤** | | 田植後14日～収穫50日前 | **5.0葉** | **ノビエ　残効性あり** |
| | ｸﾘﾝﾁｬｰEW | | 田植後20日～収穫30日前 | 6.0葉 | ノビエ　展着剤加用<br>10a当り100ml/水25～100ℓ |
| ヒエ・広葉剤 | レブラス1ｷﾛ粒剤 | 4 | 田植後14日～収穫60日前 | 4.0葉 | オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、ホタルイ、マツバイ |
| | ﾜｲﾄﾞｼｮｯﾄ1ｷﾛ粒剤 | 2 | 田植後15日～収穫45日前 | 4.0葉 | オモダカ、クログワイ、セリ、マツバイ、ホタルイ |
| | ｸﾘﾝﾁｬｰﾊﾞｽME液剤 | 2 | 田植後15日～収穫50日前 | 5.0葉 | ノビエ、広葉雑草<br>10a当り1,000ml/水70～100ℓ |
| | アトトリ1ｷﾛ粒剤 | 1 | 田植後20日～収穫45日前 | 4.0葉 | ノビエ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ |
| 広葉 | ﾊﾞｻｸﾞﾗﾝ液剤 | 1 | 田植後15日～収穫50日前 | 広葉雑草　落水又はごく浅水で使用<br>10a当り500ml/水70～100ℓ | |

### ２．病害虫防除

一部ほ場でイネミズゾウムシが確認されており、今後の発生量は平年に比べ多いとの予報が出されております。イネヒメハモグリバエについては発生量が少なく、村内においても被害は確認されておりませんが圃場内を注視のうえ、葉の枯死等が見られた場合はつぎの薬剤で防除に努めてください。

| 薬剤名 | | 成分 | 使用量／10a |
|---|---|---|---|
| トレボン | 粒剤 | 1 | 2.0 kg |
| | 粉剤ＤＬ | | 3.0 kg |

**※ 農薬の使用に当たっては使用法を確認し、環境に配慮した施用量等を心がけてください。**

「水稲技術情報」https://www.ja-ogata.or.jp/farming2/をホームページで閲覧の際は、これまで必要だったパスワード入力なしで閲覧可能になりました。

※水稲以外の技術情報は、これまで通りパスワードの入力が必要です。